

Delagil® Pulver 0,4 g/g

Synthetischer Gerbstoff (Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert, Natriumsalz)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Delagil Pulver und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Delagil Pulver beachten?
3. Wie ist Delagil Pulver anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Delagil Pulver aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST DELAGIL PULVER UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Delagil Pulver ist ein Dermatikum.

Synthetischer Gerbstoff beeinflusst aufgrund seiner adstringierenden, gerbenden und schorfbildenden Wirkungen bestimmte entzündliche, das heißt nässende und juckende Hauterkrankungen. Er läßt sich für folgende Indikationen einsetzen: Entzündliche Hauterkrankungen, insbesondere mit intertriginöser Lokalisation, z.B. Windeldermatitis.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON DELAGIL PULVER BEACHTEN?

Delagil Pulver darf nicht angewendet werden wenn Sie allergisch gegen synthetischen Gerbstoff bzw. einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
Was für Vollbäder grundsätzlich gilt, trifft auch für Delagil Pulver zu: Vollbäder dürfen nicht angewendet werden bei schwerer Herzmuskel- und Kreislaufschwäche, bei Bluthochdruck, fieberhaften Erkrankungen und Tuberkulose.
Bei größeren Hautverletzungen und akuten Hauterkrankungen sollte Delagil Pulver nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt angewandt werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Delagil Pulver anwenden.

Wenn Delagil Pulver in die Augen gelangt, sollten Sie die Augen ca. 10 Minuten unter fließendem Wasser spülen und anschließend einen Augenarzt aufsuchen. Nach versehentlicher Einnahme sollte zunächst Wasser getrunken werden. Anschließend ist der Arzt aufzusuchen, der über die weiteren Therapiemaßnahmen entscheidet.

Da in Gegenwart von alkalischen Seifen die Wirksamkeit von Delagil Pulver beeinträchtigt wird, soll während der Anwendung von Delagil Pulver nicht gleichzeitig Seife benutzt werden.

Bei Anwendung von Delagil Pulver zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bisher keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Delagil Pulver kann auch während der Schwangerschaft und Stillzeit eingesetzt werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

3. WIE IST DELAGIL PULVER ANZUWENDEN?

Wenden Sie Delagil Pulver immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die übliche Dosis ist:

Vollbäder (bei Erwachsenen):

30 g Delagil Pulver auf ca. 150 l Wasser (= 3 Portionsbeutel oder 6 Messlöffel), Temperatur: 32-35 °C, Dauer: 10-15 Minuten, Häufigkeit: 2-3mal wöchentlich bis 1mal täglich.

Vollbäder (bei Kindern):

5 g Delagil Pulver auf ca. 25 l Wasser (= ½ Portionsbeutel oder 1 Messlöffel), Temperatur: 32-35 °C, Dauer: 10-15 Minuten, Häufigkeit: 2-3mal wöchentlich bis 1mal täglich.

Sitzbäder:

10 g Delagil Pulver auf ca. 25 l Wasser (= 1 Portionsbeutel oder 2 Messlöffel), Temperatur: 32-35 °C, Dauer: 10-15 Minuten, Häufigkeit: 2-3mal wöchentlich bis 1mal täglich.

Teilbäder (Hand-, Arm-, Bein- oder Fußbäder):

5 g Delagil Pulver auf ca. 10 l Wasser (= ½ Portionsbeutel oder 1 Messlöffel), Temperatur: 32-35 °C, Dauer: 10-15 Minuten, Häufigkeit: 2-3mal wöchentlich bis 1mal täglich.

Feuchte Umschläge, Waschungen und kalte Kompressen:

5 g Delagil Pulver auf ca. 5 l Wasser (= ½ Portionsbeutel oder 1 Messlöffel), Dauer: 15-20 Minuten, Häufigkeit: 2-3mal täglich.

Hinweis

Der oben angegebene Messlöffel liegt nur der 150 g-Dose bei.

Bei hochakut entzündeter Haut, die bereits bei leichter Berührung mit Schmerzen und Brennen reagiert, wird eine Verringerung der Konzentration von Delagil Pulver empfohlen:

2,5 g Delagil Pulver auf ca. 5 l Wasser (= ¼ Portionsbeutel, entspricht einem gestrichenen Teelöffel oder ½ Messlöffel).

Art der Anwendung

Delagil Pulver dient zur Zubereitung von Voll-, Teil- und Sitzbädern, zur Bereitung von Umschlägen.

Nur zur äußerlichen Anwendung geeignet.

Nicht für die Anwendung am Auge.

Delagil Pulver löst sich in kaltem, lauwarmem und warmem Wasser gleichermaßen gut auf. Dennoch empfiehlt es sich, Delagil Pulver in den Strahl des einlaufenden Wassers zu geben und mit der Hand anschließend zu verteilen. Für Sitzbäder können neben Dusch- und Badewannen auch von der Größe her geeignete Schüsseln benutzt werden. Für Teilbäder eignen sich Waschbecken, Duschwannen oder ausreichend große Schüsseln. Spezielle Sitzbadewannen, Arm- und Fußbadewannen sind im Fachhandel (z.B. Sanitätshäuser) erhältlich.

Dauer der Anwendung

Wenden Sie Delagil Pulver ohne ärztlichen Rat nicht länger als 7 Tage an.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Delagil Pulver zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Delagil Pulver angewendet haben, als Sie sollten

Sie können die Behandlung mit der angegebenen Dosierung fortsetzen. Bei einer kurzfristigen Überdosierung sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

Wenn Sie die Anwendung von Delagil Pulver vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Delagil Pulver abbrechen

Sie könnten den Behandlungserfolg gefährden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie die Behandlung mit Delagil Pulver abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Bei der Anwendung von Gerbstoffen an der Haut können sehr selten leichte Hautreizungen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST DELAGIL PULVER AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf.

Nicht über 25 °C lagern.

Delagil Pulver in der 150 g-Dose:

Dose nach Entnahme der benötigten Menge wieder gut verschließen.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach «Verwendbar bis» angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Die Haltbarkeit nach Anbruch der Dose beträgt 15 Wochen.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Delagil Pulver enthält

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist synthetischer Gerbstoff (Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert, Natriumsalz).

1 g Badezusatz enthält 0,4 g synthetischen Gerbstoff.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Calciumlactat-Pentahydrat, Natriumsulfat, Parfümöl Sport PH-Y

Wie Delagil Pulver aussieht und Inhalt der Packung

Delagil Pulver ist ein gelblich-weißes, feines Pulver und ist in Packungen zu 5x10 g, 10x10 g, 40x10 g und 150 g erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Dermapharm AG

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Tel.: 089 / 641 86-0

Fax: 089 / 641 86-130

E-Mail: service@dermapharm.de

Hersteller

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2015.

